



BOTOX

BEHANDLING OG OPLYSNINGER OM BEHANDLING MED BOTOX





HVAD ER BOTOX OG HVORDAN VIRKER DET?

Botulinumtoksin også kendt som “botox” er et muskelafslappende lægemiddel fremstillet på kroppens naturlige proteiner og aminosyrer fra bakterien *Clostridium botulinum*. Botulinumtoksin går ind og delvis lammer den behandlede muskel. Når musklen lammes, vil man se at det omkringliggende væv afslappes og rynker forsvinder. Denne virkningsmekanisme har i årtier været anvendt medicinsk, til sygdomme med øget aktivitet i musklerne.

Før din behandling:

Det er et lovkrav, at der foretages en forundersøgelse ved en læge, minimum 48 timer før din første behandling. Dette kan i dag gøres online. Så snart du booker din botox konsultation, vil du modtage et link til din online konsultation. Du vil også modtage et spørgeskema som du skal udfylde og returnere, før forundersøgelsen

Undgå blodfortyndende præparater i form af fiskeolie, Ipren, Treo, Kodimanyl og lignene præparater, minimum 4 dage før din behandling


På behandlingsdagen skal du undlade at bruge makeup og cremer i dit ansigt.

BEHANDLINGEN:

- Selve Botox behandlingen varer ca. 15-20 minutter.
- Huden afrenses.
- Din behandler markerer med en blyant de områder som skal behandles.
- Botox injiceres i de tilsigtede muskler og områder, du ønsker behandlet.
- Injiceringen foregår med en meget tynd og lille steril nål.
- Du kan kortvarig mærke svien og lette smerter ved injiceringen.

RESTRIKTIONER EFTER BEHANDLINGEN

- Undgå makeup/produkter i 4 timer efter din behandling.
- Undgå at gnubbe, massere eller tryk på dit ansigt i 24 timer efter din behandling, så du undgår at toxinet spreder sig til andre muskler.
- Undgå at ligge helt "fladt" i min. 4 timer efter din behandling, Hold hovedet højt.
- Undgå hård fysisk træning og kraftig varme de første to døgn.
- Undgå blodfortyndende præparater i form af fiskeolie, Iprex, Treo, Kodimanyl og lignene præparater, minimum 1 dag efter din behandling





LETTE BIVIRKNINGER

- Let “bistik” lign. hævelse på indstiksstedet
- Let ømhed
- Hovedpine
- Sjældent ses en forbigående lettere hængende øjenbryn ved behandling af panderegion eller anden uhensigtsmæssig midlertidig asymmetri.

MEGET SJÆLDNE BIVIRKNINGER

- Allergisk reaktion
- Infektioner

KONTRAINDIKATIONER

- Gravide og ammende.
- Personer under 18 år.
- Personer med hudsygdomme eller aktive hudlidelser, i det ønskede behandlingsområde.
- Personer med en overfølsomhed over for lægemidlet botulinumtoksin type A.
- Personer med neuromuskulært sygdom, Myasthenia gravis.



VARIGHED

Injiceret botulinumtoksin vil over tid blive nedbrudt af kroppens egne naturlige processer og udskilt gennem urinen. Virkningen kan variere fra cirka 3-6 måneder.

Du vil blive tilbudt en opfølgende kontroltid efter 3-4 uger.

KONTAKTINFORMATIONER

Har du spørgsmål til Botox behandlingen, er du altid velkommen til at kontakte kundeservice på telefon: 28117373

smooth